Coléoptères nouveaux ou peu connus de la République Argentine

Par

M. Pic

C'est à notre estimé collègue C. Bruch que je dois la connaissance, ou la communication, de la plupart des insectes cités dans le présent article. Cet excellent correspondant m'a permis, par suite de ses communications anciennes, de décrire déjà un certain nombre de nouveautés; j'ai le plaisir de continuer, dans cette nouvelle publication scientifique, à laquelle je souhaite une longue et productive prospérité, la série heureuse de ses découvertes nombreuses.

Dasytes bifurcatus Pic. — Décrit originaire du Grand Chaco (in coll. Pic). C. Bruch la possède de Fives Lille, Santa Fe.

La variété nouvelle **lillensis**, originaire de cette dernière provenance (coll. Bruch et Pic) est noire, ayant une bordure testacée aux élytres qui s'efface en avant sur la suture avec, en plus, une linéole humérale et une petite macule antéapicale de même coloration. Les articles intermédiaires des antennes, les tibias et tarses en partie sont testacés.

Artrobrachys obscuripes n. sp. — Oblongus, nitidus, breve et fusco pubescens, niger, antennis pro parte tarsisque, elytris apice reducte rufo marginatis, scutello griseo pubescente; elytris diverse, pro parte dense, sat fortiter punctatis.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence obscure assez courte et néttement redressée sur les élytres avec l'écusson pubescent de gris, noir, antennes en majeure partie et tarses roux, extrémité des élytres marquée de roux, en plus ces organes courtement marginés de cette coloration à l'extrémité. Tête assez grosse et peu longue, à ponctuation forte et rapprochée, bifovéolée entre les yeux; antennes courtes, très dentées vers l'extrémité avec le dernier article subtriangulaire; prothorax court et large, subarqué sur les côtés, rétréci en avant, étroitement rebordé latéralement, non crénelé mais cilié, orné longitudinalement d'une carène latérale médiocre, à ponctuation forte, écartée au milieu, sur fond un peu alutacé; élytres peu plus large que le prothorax, un peu élargis après le milieu, assez courts, courtement rétrécis et assez explanés à l'extrémité, subconvexes avec une forte dépression antérieure présuturale, à ponctuation pas très forte en partie rapprochée.

Long.: 4 mill. — Fives Lille, Santa Fe, 27, X, 1925.

(C. Bruch). — Type unique in coll. Bruch.

Voisin de *A. testaceolimbatus* Pic, en diffère par la ponctuation

moins forte et plus rapprochée des élytres avec ces organes plus brièvement marginés de noir et les pattes foncées.

Silis argentina Pic. — Décrit du Tucumán sur un exemplaire ♂ ayant le prothorax maculé de noir. (Type in coll. Pic).

C. Bruch a capturé, en dicembre 1921, à Alta Gracia, Córdoba, deux ♂ et une ♀ qui se rapportent à la même espèce comme variété en ayant le prothorax concolore, roux (var. nov. **Bruchi**).

La ♀ (sexe inconnu jusqu'alors) présente un prothorax court et large, subanguleux sur le milieu de ses côtés et un peu échancré vers la base.

Une paire de la variété nouvelle se trouve dans la coll. Bruch, un deuxième ♂ se trouve dans ma collection.

Pectinepitragus n. gen. — Capite breve et lato, oculis prominulis, integris, thorace paulo distantibus, mandibulis apice bidentatis; antennis brevibus, articulis 3 et sequentibus longe pectinatis, articulo ultimo inaequale, tuberculato; thorace obconico, antice paulo attenuato, angulis fere rectis; elytris thorace valde latioribus, subconvexis, postice attenuatis; coxis anticis globulosis, parum distantibus; tibiis tarsisque gracilibus, his longissimus, infra ciliatis.

Je crois devoir placer ce genre près de *Sphenaria* Mén., il en diffère par les mandibules bidentées, le prothorax obconique et surtout par la structure des antennes; par ce dernier caractère ce genre est caractérisé entre tous.

Pectinepitragus pubescens n. sp. — Elongatus, nitidus, sat dense minute et ruguloso punctatus, rufus, mandibulis apice oculisque nigris.

Long.: 8 mill. — Prov. La Rioja: Patquia. (C. Bruch, in coll. Bruch).

Mimolagria n. gen. — Capite breve, sat lato, oculis prominulis, integris; antennis filiformibus, sat brevibus; thorace lato, postice fortiter strangulato; elytris thorace valde latioribus, subparallelis, epipleuris integris; coxis anticis conicis, illis et intermediis approximatis; mesosterno incarinato; pedibus gracilibus, tibiis apice minute bimucronatis, tarsis sat gracilibus, articulo 1° plus minusve elongato.

Voisin de *Pseudolagria* Chp., en diffère par le mesosternum non caréné, les tibias munis d'épérons, les antennes un peu moins grêles et plus courtes, le prothorax à étranglement postérieur large et très marqué.

Mimolagria Bruchi n. sp. — Sat elongata, supra fere glabra, infra minute et sparse pilosa, parum nitida, nigra, infra corpore pro parte rufescente, capite antice thoraceque aurantiacis, illo medio minute, lateraliter et postice longiore, nigro notato; capite thoraceque dense et ruguloso punctatis, illo medio longitudinaliter et externe arcuato impresso; elytris fortiter denseque punctatis; abdomine et pedibus pro parte rufescentibus.

Long.: 10 mill. — Gob. Chubut (C. Bruch, in coll. Bruch).

Falsolagria marmorata n. sp. — Oblongo-elongata, nitida, sparse sat breve griseo pubescens, rufa, pro parte picea, diverse et multi albonotata, antennis pedibusque albo annulatis aut maculatis; capite thoraceque minute et dense punctatis, illo supra ad medium 4 et postice

3 tuberculato, tuberculis minutis glabris, transverse dispositis; scutello subcuadrato piceo; elytris externe brunneo et sinuate lineatis, multi et diverse albo maculatis; infra corpore antice late piceo, metasterno albo maculato.

Long.: 10 mill. — Gob. Río Negro (C. Bruch, in coll. Bruch)

Mecopselaphus maculicollis Sol. — Gob. Neuquén (C. Bruch). — Espèce originaire du Chili et me paraissant nouvelle pour la République Argentine.

Oxacis plumbeipennis n. sp. — Angustata nitida, griseo pubescens, rufo-testacea, elytris griseo-plumbeis, opacis, mandibulis apice, antennis pedibusque pro majore parte nigris.

Allongé, brillant avec les élytres mats, revêtu d'une pubbescence couchée gris et courte, assez rapprochée sur les élytres, roux-testacé avec les élytres d'un gris plombé, le sommet des mandibules, les yeux, les antennes et les pattes en majeure partie noirs, cuisses largement testacées à la base. Avant corps à ponctuation assez fin et rapprochée; tête assez longue avec les yeux un peu plus larges que le bord antérieur du prothorax, celui-ci plus long que large, dilaté-arrondi en avant, plus étroit et presque droit sur la base, ayant une très faible impression basale devant l'écusson, mandibules longes, simples; élytres nettement plus larges que le prothorax, subparallèles, à ponctuation fine et dense; pattes grêles, crochets des tarses simples.

Long.: 8 mill. — Prov. Catamarca: Amanao, 14. I. 1923. (coll. C. Bruch).

Se rapproche, par sa forme, de *O. coerulea* Chp., mais très facile à distinguer par sa coloration.

Oxacis sulcaticollis n. sp. — Angustata, subparallela, nitida, minute punctata, parum dense griseo pubescens, nigro-plumbea, capite antice membrisque testaceis.

Etroit, subparallèle, brillant, à ponctuation générale fine, plus dense sur les élytres, orné d'une pubescence grise couchée peu dense et assez longue, noir plombé à reflets métalliques avec le devant de la tête et les membres entièrement testacés. Tête robuste, peu longue avec les yeux, qui sont peu saillants, pas plus large que la partie antérieur du prothorax, mandibules robustes, paraissant simples; prothorax plus long que large, un peu élargi en avant, muni d'un sillon longitudinal médian et d'une dépression transversale; élytres peu plus larges que la base du prothorax, parallèles; pattes assez robustes.

Long.: 7 mill. — (C. Bruch, in coll. Bruch).

De forme rappelle *O. schistacea* Chp., en diffère à première vue, par le dessus non bleuté.

Oxacis Bruchi n. sp. — Sat angustata, fere opaca, plus minusve dense albo sericeo pubescens, nigra, capite antice, antennis diverse, scutello et pedibus testaceis, elytris nigris, ad suturam paulo testaceis et externe albo vittatis (*forma typica*), aut ad suturam et lateraliter plus minusve testaceo vittatis (v. **Weiseri**).

Assez étroit, presque opaque par suite de sa ponctuation dense ou de son revêtement gris soyeux d'ordinaire dense, noir avec le devant de la tête ainsi que les palpes, les antennes entièrement, parfois avec le 1er. article seul et les pattes testacés. Ecusson noire (*forme*

type) ou testacé (*var.*) ; élytres variant de coloration, soit noirs avec la suture diversement teintés de testacé, en dessous d'une bande blanche, et les côtés ornés d'une bande pubescente blanche (*forme type*) ou bien avec les élytres plus uniformement soyeux, la suture étant plus ou moins largement testacée, en outre, une bande externe de même coloration, variant d'étendue (var. *Weiseri*).

Long.: 6-7,5 mill. — Prov. Mendoza. (C. Bruch) ; Prov. Catamarca: Famabalasto et Hualfin (Weiser).

Types in coll. Bruch et Pic.

Distinct, à première vue, du précédent par la pubescence non uniformement disposée sur les élytres et par le prothorax dépourvu de sillon médian.

Copodita multilineata n. sp. — Plus minusve elongata, nitida, sat fortiter et diverse punctata, minute et sparse griseo pubescens, pro parte testacea, pro parte nigra, membris plus minusve testaceis, capite testaceo, medio diverse nigro notato ; thorace testaceo, medio nigro lineato et lateraliter antice nigro maculato ; elytris diverse testaceo et nigro aut piceo longitudinaliter vittatis.

Long.: 7-9 mill. — Santiago del Estero (Wagner) ; Sierras de Córdoba (Bruch), etc.

Peut se placer près *C. trifoveolata* Chp., mais en diffère par les bandes des élytres et l'avant corps marqué de foncé.

Espèce très variable, offrant les principales modifications suivantes :

a) Elytres ornés, en plus de la suture et de la marge, de 4 bandes étroites claires sur fond de poix (*forme type*), in coll. Bruch et Pic.

b) Elytres à bandes claires en partie oblitérées et réduites d'ordinaire à deux (var. **obliterata**), in coll. Bruch et Pic.

c) Elytres à pubescence plus fournie d'où bandes moins nettes (var. **tucumana**), du Tucumán, coll. Bruch et Pic.

d) Elytres à coloration foncière plus sombre, d'où lignes claires plus tranchées, avec une macule noir (var. **paranana**), Alto Paraná, (coll. Pic).

e) Elytres foncés, mats, à petite macule humérale et trait postscutellaire testacés, avec des traces, à peine indiquées, de bandes claires, prothorax preque entièrement noir (var. **obscuricolor**), Santiago del Estero (coll. Bruch).

Copodita punctatithorax n. sp. — Sat elongata, nitida, breve et sparse griseo pubescens, nigra, elytris griseo olivaceis, antennis ad basin pro parte, femoribus late tarsisque apice testaceis.

Assez allongé, brillant, orné d'une pubescence gris courte et espacée, couchée avec quelques poils surélevés sur les élytres, à ponctuation assez forte et rapprochée sur l'avant corps, fine et dense sur les élytres, noir, élytres d'un gris olivâtre, parties des membres testacées. Tête assez longue avec les yeux peu plus larges que le bord antérieure du prothorax, mandibules bifides au sommet, prothorax plus long que large, peu élargi antérieurement, droit sur les côtés postérieures, orné d'une dépression sur le milieu postérieur ; élytres bien plus larges que le prothorax, peu longs, faiblement costés ; pattes assez grêles, crochets des tarses simples.

Long.: 8 mill. — Catamarca: Sarso (Weiser leg., in coll. Bruch).

Espèce très distincte entre toutes par sa coloration.